

Prunier 'Victoria'

Prunus domestica 'Victoria'

Type : Arbre fruitier

Taille adulte (H x L): 4m x 4m

Période de floraison : Avril

Utilisation : Plante comestible, Plante fruitière

Ce prunier de faible vigueur produit des fruits assez larges, ovale-long, à peau de couleur rouge sur un fond jaune. Leur chair jaune, avec un goût de moyenne qualité, n'est pas attachée au noyau. Les prunes se récoltent la deuxième moitié d'août. Ce prunier autofertile et à la floraison hâtive a une grande valeur comme pollinisateur. Fertilité hâtive. Haute productivité régulière.

À propos de l'espèce Prunus domestica

Les pruniers préfèrent les climats continentaux, aux saisons bien marquées, à celui du littoral exposé aux vents, aux embruns et souvent à l'humidité. Leurs fruits sont sucrés, juteux et parfumés, se consommant à l'état frais, en conserve, au sirop, en confitures,

Description détaillée de Prunier 'Victoria'

Plantation

Exposition conseillée Soleil

Rusticité Rustique (T° mini : -15°)

Humidité du sol Pas trop sec à frais

PH du sol Neutre

Type de sol Normal

Richesse du sol Normal

Caractéristiques produit

Type Arbre fruitier

Utilisation Plante comestible|Plante fruitière

Type de feuillage Caduc

Hauteur De 3 à 5m

Hauteur à maturité (m) 4

Largeur à maturité (m) 4

Port Etalé

Saison d'intérêt Printemps-Eté

Mois de floraison Avril

Couleur(s) de floraison Blanc

Genre Prunus

plantation

dans un emplacement dégagé et ensoleillé. Les Prunus fleurissant hâtivement au printemps doivent être plantés en site abrité. S'ils vivent en sol ordinaire, ils se plaisent particulièrement en sol calcaire (sauf les espèces persistantes).

taille

(Fevrier-Avril) Caduques : avant la reprise en végétation, tailler le bois malade ou mort et les branches se croisant pour ne garder que les branches vigoureuses et maintenir un beau port. Sauf pour *P. glandulosa* et *P. triloba* : après la floraison, tailler toutes les branches à 1/4 de leur longueur, au-dessus d'un bourgeon vigoureux, pour obliger la plante à reformer de nouvelles pousses près de la base. Persistants : après la floraison, tailler légèrement et supprimer les rameaux qui déséquilibrent le port de la plante. Haies : pour les caduques, après la floraison ; pour les persistants, au début ou en fin de printemps.